

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

### ILE DE FRANCE

Bulletin Technique n° 23 du 28 juillet 2009 - 2 pages


## **Actualité**

#### Maïs

Les infestations de pucerons ont été fortement réduites par les auxiliaires, encore nombreux dans les parcelles.

Le profil du vol de **pyrale** de cette année reste encore atypique (voir graphique) avec absence d'un véritable pic de vol, (des pics très différents d'un site à un autre, lorsque pic il y a). Cette tendance était déjà similaire l'an passé. Peu de pontes ont été observées, 10 à 15% de pieds porteurs au plus dans quelques parcelles lors des relevés du 6 et 13 juillet, mais encore des pontes fraîches cette semaine sur le secteur de Cléry en Vexin (95).

Captures moyennes de pyrale réseau SRAL – Fredon – Chambre IDF



Direction Régionale et Interdépartementale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt.

Service Régional de l'Alimentation ILE DE FRANCE 18 avenue Carnot 94234 CACHAN Tél: 01.41.24.18.00 Fax: 01.41.24.18.32

Bulletin réalisé avec la participation de la FREDON Ile de France

Imprimé à la station D'Avertissements Agricoles de Rungis Directeur gérant : S. HOFFERER

Publication périodique C.P.P.A.P n°0909 B 07113 ISSN n°0767-5542

Tarifs individuels 2009 87 euros (papier) 76 euros (fax) 68 euros (mail) Aucune chrysomèle n'a été détectée à ce jour dans notre réseau de 400 pièges sur l'ensemble de la région. Des captures ont en revanche été effectuées en Alsace (Haut Rhin), Rhône Alpes (plusieurs départements) et Bourgogne (Saône et Loire) à proximité ou non d'anciens foyers. L'insecte est également actif en Allemagne et dans le nord de l'Italie.

#### Ergot

Merci de nous signaler le présence éventuelle d'ergot lors de la récolte de vos céréales (présence de gros sclérotes foncés).

Au champ, on trouve beaucoup d'épis noircis par le développement de champignons secondaires.



5. Do (8488

P31

#### **Betterave**

6 1 6 1 1 0 R O - 4 - h 5 pm 2 0

Le seuil d'intervention maladies est atteint dans un certain nombre de parcelles du réseau, que ce soit pour la cercosporiose ou la ramulariose (5% de feuilles porteuses), ou l'oïdium (15% comme à Brie comte Robert et Larchant-77 ou Vigny-95).

Le vol de teigne est un peu plus soutenu que lors des deux précédentes années (voir graphique). Les chenilles sont surtout présentes dans le sud Seine et Marne (Souppes, Burcy, La Brosse montceaux).

Les noctuelles restent également actives dans certaines parcelles.

#### Evolution des captures de teignes

réseau piégeage ITB - SRAL - Fredon - sucrerie Souppes - CA IDF

